

**ANDALUCÍA**  
CALENDARIO DE VACUNACIONES 2012

VACUNAS	EDAD													
	Recién nacido	2 meses	4 meses	6 meses	12 meses	15 meses	18 meses	3 años	4 años	6 años	10 años	11 años	12 años	14 años
Poliomielitis		VPI1	VPI2	VPI3		VPI4								
Difteria-Tétanos-Pertussis		DTPa1	DTPa2	DTPa3		DTPa4				Tdpa5 (a)				Td
Haemophilus Influenzae b		Hib1	Hib2	Hib3		Hib4								
Sarampión-Rubéola-parotiditis					TV1			TV2						
Hepatitis B	HB1(b)	HB2		HB3										
Meningitis Meningocócica C		Men C1	Men C2			Men C3								
Varicela													VVZ (C)	
Virus del Papiloma Humano														VPH (d)

(a) Tétanos, difteria y tos ferina acelular de baja carga antigénica.

(b) Los hijos de madres portadoras recibirán una dosis de inmunoglobulina en las primeras horas de vida y la 2ª dosis de vacuna al mes de vida.

(c) Personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas con anterioridad, siguiendo indicaciones de ficha técnica.

(d) Niñas nacidas a partir de 1994, siguiendo las indicaciones de la ficha técnica (actualmente tres dosis).

*Ejemplo de vacunación en cada visita para menores que no estén correctamente vacunados*

EDAD	Intervalo mínimo entre dosis. Meses contados a partir de la primera visita				
	Primera visita	1 mes	2 meses	6 meses	12 meses
< 24 meses	DTPa+ Hib <sup>(1)</sup> +VPI+ Hepat B Meningo C <sup>(2)</sup> Triple vírica <sup>(3)</sup>	DTPa+Hib+VPI+ Hepat B Meningo C (recomendado intervalo de dos meses para < 12 meses)		DTPa+Hib+VPI Hepat B	DTPa+Hib+VPI  Meningo C Continuar con el calendario.
24 meses a 6 años	DTPa <sup>(4)</sup> +Hib+VPI+ Hepat B Meningo C Triple vírica	DTPa+Hib+VPI+ Hepat B  Triple vírica <sup>(5)</sup>		DTPa+VPI Hepatitis B	DTPa+VPI Continuar con el calendario
7 a 18 años	Td <sup>(4)</sup> +VPI Hepat B Meningo C Triple Vírica Varicela <sup>(6)</sup> VPH <sup>(7)</sup> SÓLO NIÑAS	Td +VPI Hepat B Triple Vírica		Td +VPI Hepat B  VPH SÓLO NIÑAS  Continuar con las vacunaciones recomendadas para el adulto	

<b>Leyendas</b>	DTPa: Difteria, tétanos y tos ferina Hib: <i>Haemophilus influenzae tipo b</i> ... VPI: vacuna de polio Hepat B: Hepatitis B Meningo C. Meningococo C Triple vírica: Sarampión, rubéola y parotiditis (paperas) Tdpa: Tétanos, difteria y tos ferina de menor carga antigénica Td: Tétanos difteria tipo adulto VPH: Vacuna del Virus del Papiloma Humano (SÓLO NIÑAS)
<b>Notas</b>	<p>(1) Hib Según la edad de inicio de vacunación: &lt; 12 meses (4 dosis) 12-14 meses (2 dosis) &gt; 15 meses (1 dosis)</p> <p>(2) Para menores de 12 meses: dos dosis durante el primer año de vida y una tercera en el segundo año. Para mayores de 1 año sólo 1 dosis.</p> <p>(3) La primera dosis de triple vírica a partir de los 12 meses de vida, salvo situaciones especiales de brote de alguna de estas enfermedades.</p> <p>(4) A partir de los 4 años se puede sustituir la DTPa por Tdpa de menor carga antigénica, siempre que no se pueda usar la vacuna Pentavalente o Hexavalente, por no ser necesario vacunar frente a esos antígenos.</p> <p>(5) La segunda dosis de triple vírica se puede administrar a las 4 semanas de la primera o esperar a los tres años de vida y continuar calendario.</p> <p>(6) En 6° de primaria Escolares no vacunados de varicela y que no hayan padecido la varicela</p> <p>(7) VPH. Tras la administración de la primera dosis, se completará la vacunación con las dosis restantes, aún cuando se haya sobrepasado el intervalo entre dosis.</p>